



SUMARIO DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

CALCIO FATRO®

2. COMPOSICIÓN

Glucoheptonato cálcico	117,8 mg
Gluconato cálcico	93,3 mg
Hipofosfito cálcico	22,5 mg
Glicerofosfato cálcico	3,7 mg
Ácido bórico	19 mg
Cloruro magnésico	30 mg
Excipiente c.s.p.	1 ml

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

4. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

CALCIO URIACH es una asociación de sales solubles de calcio, fósforo y magnesio que reúne dos cualidades importantes: una máxima riqueza en elementos esenciales y una óptima tolerancia general y local. Aporta por cada 100 ml: 2,3 g de calcio; 0,8 g de fósforo y 0,3 g de magnesio. Su composición le confiere una elevada seguridad y eficacia terapéutica.

5. DATOS CLÍNICOS

5.0. ESPECIES DE DESTINO

Bóvidos, équidos, óvidos, cápridos, porcino, perros, gatos y conejos.

5.1. INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Hipocalcemia post-parto, fiebre vitularia, tetanias, eclampsias, raquitismo y pseudorraquitismo, fragilidad ósea, pérdida del tono corporal, neurosis. En general trastornos del metabolismo del calcio.

5.2. CONTRAINDICACIONES

No administrar en caso de insuficiencia renal, estados de hipercalcemia e hipercalciuria.



5.3. EFECTOS SECUNDARIOS

La administración endovenosa rápida produce vasodilatación periférica, rubrefacción de las mucosas, bradicardia y arritmia sinusal, llegando a producir paros cardíacos si se administra con gran rapidez.

5.4 PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

No se han descrito.

5.5 UTILIZACIÓN DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA

No se han descrito contraindicaciones durante estos periodos.

5.6 INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN

No administrar con digital. Si se administra vía oral interfiere en la absorción de las tetraciclinas.

5.7 POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Vía endovenosa lenta, intramuscular y subcutánea.
Bóvidos y équidos adultos: 1-2 ml/kg p.v.
Cerdos reproductores, terneros y potros: 50-60 ml
Cerdos engorde, óvidos y cápridos: 30-50 ml
Perros, gatos y conejos: 2-5 ml

5.8. SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de intoxicación por sobredosificación las alteraciones cardiovasculares se resuelven con coramina.

5.9 ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE DE DESTINO

No se han descrito.

5.10 TIEMPO DE ESPERA

No precisa



5.11 PRECAUCIONES ESPECIFICAS QUE DEBERÁ TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE EL PRODUCTO A LOS ANIMALES

Mantener fuera del alcance de los niños.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

6.2 PERIODO DE CADUCIDAD

3 años.

6.3 PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar protegido de la luz y a temperatura fresca.

6.4 NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Frascos de 250 y 500 ml.

6.5 NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE LA PUESTA EN EL MERCADO

Fatro Ibérica, S.L.
Constitución 1
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

6.6 PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBAN OBSERVARSE PARA EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, SUS RESIDUOS

No se han descrito.

7. INFORMACIÓN ADICIONAL

Nº de autorización de comercialización: 9427

Condiciones de dispensación: con receta veterinaria.