

APODERM

Antiséptico tópico en spray

1. COMPOSICIÓN (por ml)

Clortetraciclina clorhidrato.....(Equiv. a 2 g de Clortetraciclina base)	2,15 g
Colorante autorizado (E-131)	0,2 g
Eudragit.....	1,75 ml
Excipiente c.s.p.....	100 ml

2. ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

Bovino, ovino, caprino, cerdos, équidos, aves, perros y gatos.

TODAS LAS ESPECIES: En general se aplica en el tratamiento de heridas accidentales o quirúrgicas, lesiones infecciosas de cascos y pezuñas (coadyuvante en tratamiento del pederero, infecciones interdigitales, llagas, úlceras y abscesos abiertos).

3. VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica

4. POSOLOGÍA

Agitar el spray antes de usarlo; pulverizar la zona afectada desde una distancia de 15-20 cm con el brazo totalmente extendido, durante 2-3 segundos. Repetir el tratamiento según evolución y gravedad de las lesiones.

5. TIEMPO DE ESPERA

En caso de sacrificio de urgencia decomisar la zona tratada.

6. PRECAUCIONES ESPECIALES

Mantener al abrigo de la luz, en lugar seco y fresco (25°C ± 2

6. PRESENTACIÓN

Envase aerosol de 335 mL de capacidad.

Nº Registro: 0270 Esp

- Esta ficha podrá sufrir variaciones en base a la legislación vigente en los distintos países donde se encuentre registrado el producto.