

BIOACRYL

Agente lubricante



1. COMPOSICIÓN

Ácido poliacrílico: 2 g.; Hidróxido sódico: 0,048 g.; Amonio 25%: 1,24 g.; Solución fenol 90%: 0,54 g.; Agua purificada: c.s.p. 100 g.

2. CONDICIONES DE EMPLEO

El producto puede ser utilizado vía rectal, ginecológica y en obstetricia, particularmente en casos de ruptura prematura de la membrana fetal, pérdida de líquido amniótico y en parto seco.

El producto puede ser aplicado directamente sobre la mano o sobre los instrumentos, y puede ser utilizado para lubricar el canal del parto o el recto.

Aplicar directamente en la mano, en los instrumentos o directamente en la zona a lubricar.

En casos de rotura de la bolsa amniótica y salida de líquido amniótico, se puede mezclar con agua en proporción 1 parte de producto y 2/3 partes de agua, para utilizar como infusión intrauterina.

En proporción 1:8/10 se utiliza por vía rectal para ablandar el colapso intestinal.

3. USO EN ANIMALES

Equinos, bovinos, ovinos, porcinos y perros.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

No se han descrito.

5. PRECAUCIONES ESPECIALES

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Evitar contacto con ojos y mucosas.

6. PRESENTACIÓN

Envase de 250 g.

Nº inscripción zoosanitarios: HCMR-0130

* Esta ficha podrá sufrir variaciones en base a la legislación vigente en los distintos países donde se encuentre registrado el producto.