



ANTISEDAN® Susp. Inyectable para Perros y Gatos

Cada ml de ANTISEDAN contiene

Atipamezol (Clorhidrato) 5.0 mg

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable

Especies de destino

Perros y gatos

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Reversión de los efectos sedantes producidos por la medetomidina o la dexmedetomidina en perros y gatos; para devolver al animal a su estado normal.

Para contrarrestar posibles casos de sobredosificación de medetomidina.

Contraindicaciones

Antisedan no debe emplearse en animales con lesiones renales, hepáticas cardiopatías o en deficiente estado sanitario.

Advertencias especiales para cada especie de destino

En perros pueden presentarse vómitos, disnea y micción incontrolada, puede aparecer un descenso transitorio de la presión arterial en los 10 primeros minutos post-inyección.

En gatos pueden presentarse casos de hipotermia, si se emplean dosis bajas para lograr una reversión parcial de los efectos de la medetomidina o dexmedetomidina.

Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Debido a su efecto α -2 adrenérgico antagonista, Antisedan puede inducir un descenso ligero y transitorio de la presión arterial, vómitos y micción incontrolada.

Uso durante la gestación o la lactancia

Su uso no está recomendado durante la gestación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Se desaconseja su empleo concomitante con medicamentos que actúen sobre el Sistema Nervioso Central

Posología y vía de administración

PERROS: la dosis de Atipamezol a emplear, depende de la dosis de Medetomidina o de Dexmedetomidina previamente utilizada; expresada en $\mu\text{g}/\text{kg}$ p.v. corresponde a 5 veces la dosis de Medetomidina entre 50 y 400 $\mu\text{g}/\text{kg}$.p.v o 10 veces la dosis de Dexmedetomidina. Lo que equivale a la misma dosis en ml de ANTISEDAN (Atipamezol a la concentración de 5 mg/ml) que la previamente usada del sedante medetomidina la concentración de 1 mg/ml o de Dexmedetomidina a una concentración de 0,5 mg/ml.

GATOS: la dosis de atipamezol a emplear, expresada en $\mu\text{g}/\text{kg}$ p.v. es de 2 veces y media la dosis de medetomidina o 5 veces la dosis de dexmedetomidina, previamente utilizadas. Lo que equivale a la mitad de la dosis en ml de ANTISEDAN (Atipamezol a la concentración de 5 mg/ml) que la previamente usada del sedante medetomidina a la concentración de 1 mg/ml o de dexmedetomidina 0,5 mg/ml

Generalmente se administra entre 15 y 60 minutos después de la aplicación de medetomidina o dexmedetomidina mediante inyección intramuscular. El animal recupera su estado normal entre 5 y 10 minutos post-aplicación de ANTISEDAN.

Periodo de validez

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días

Precauciones especiales de conservación

Conservar a temperatura inferior a 25°C

Conservar en lugar seco

Una vez abierto el vial conservar a temperatura inferior a 25 °C y protegido de la luz

Presentaciones comerciales

Vial conteniendo 10 ml

Número(s) de la autorización de comercialización

976 ESP